

TROIS EUCNEMIDIDAE NOUVEAUX DE MADAGASCAR,

PAR M. E. FLEUTIAUX.

**Fornax Seyrigi** n. sp. — 10 à 14 mm.

Oblong, convexe; brun; pubescence rousse. Tête convexe, densément ponctuée, très légèrement impressionnée sur le bord en avant; crête interoculaire interrompue sur la base de l'épistome; celui-ci un peu moins large en arrière que l'espace susantennaire, bord antérieur arrondi, dernier article des palpes maxillaires en palette triangulaire; palpes labiaux grêles. Antennes brunes, filiformes, dépassant peu les angles postérieurs du pronotum ou atteignant la moitié du corps (♂ ?); 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> articles subégaux, de même forme. Pronotum aussi long que large, arrondi sur les côtés, graduellement rétréci en avant, convexe, densément et régulièrement ponctué. Élytres de même largeur, rétrécis au-delà de la moitié, convexes, légèrement striés; interstries plans, finement et densément ponctués. Dessous et pattes de même couleur brune.

Madagascar : Békily, janvier (A. Seyrig). Ma collection.

Ressemble à *F. vicinus* Fleutiaux; moins elliptique; antennes moins longues; ponctuation du pronotum plus nette; stries des élytres fines, mais bien marquées, interstries densément ponctués. Voisin également de *F. filicornis* Bonvouloir; pronotum graduellement rétréci en avant, moins rugueux, à ponctuation régulière; stries des élytres moins marquées; dernier article des palpes maxillaires en palette triangulaire assez large.

**Fornax Olsoufievi** n. sp. — 4 1/2 à 5 1/2 mm.

Allongé, elliptique; convexe; brun rougeâtre; pubescence jaune. Tête convexe; ponctuation grosse et rugueuse; crête interoculaire interrompue au milieu; épistome aussi large à la base que l'espace susantennaire. Antennes brunes, plus claires vers le bout, longues, atteignant la moitié du corps, filiformes; 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> subégaux, de même forme. Pronotum aussi long que large, arrondi sur les côtés et graduellement rétréci en avant, convexe; ponctuation forte et rugueuse. Élytres convexes, arrondis et rétrécis dans la partie postérieure, finement striés; interstries plans, très finement ponctués. Dessous de même couleur. Pattes plus claires.

Madagascar : Périnet (Olsoufieff). Ma collection.

Aspect de *F. rufopubens* Fairmaire; en diffère par sa couleur rougeâtre; 4<sup>e</sup> article des antennes presque aussi long que le 3<sup>e</sup>; pronotum plus graduellement rétréci en avant, plus convexe sur le dos; ponctuation plus grosse, moins profonde; stries des élytres légères mais plus distinctes.

[**Plesiofornax madagascariensis** n. sp. — 8 mm.

Allongé, elliptique; peu convexe; noir à peine brillant; pubescence jaune. Tête fortement et densément ponctuée; crête susantennaire interrompue au milieu; épistome aussi large à la base que l'espace susantennaire, fortement élargi en avant; bord antérieur arrondi. Antennes longues, atteignant la moitié du corps, subfiliformes, ferrugineuses; 4<sup>e</sup> article presque aussi long que le 3<sup>e</sup> et de même forme. Pronotum un peu moins long que large à la base, très légèrement sinué latéralement, rétréci graduellement en avant, convexe sur le dos, aplati et faiblement bi-impressionné en arrière; ponctuation forte et serrée. Élytres graduellement rétrécis, arrondis au sommet, très légèrement striés; interstries plans et finement pointillés. Dessous de même couleur. Pattes brunes.

Madagascar : Périnet (Olsoufieff). Ma collection.

Moins grand que *P. borealis* Fleutiaux; noir; tête indistinctement impressionnée en avant, ponctuation plus serrée; pronotum légèrement sinué sur les côtés, moins régulièrement et plus densément ponctué.